

pantogar®

Cápsulas

Fabricante: Merz + Co., D-60318 Frankfurt
Titular del registro: Merz + Co; D- 60318 Frankfurt

Composición

1 cápsula contiene: D-pantotenato cálcico 60 mg, L-cistina 20 mg, mononitrato de tiamina 60 mg, levadura medicinal 100 mg, queratina 20 mg, ácido p-aminobenzoico 20 mg.
Excipientes: q. s.

Propiedades y eficacia

Pantogar es un agente terapéutico capilar y para uñas de administración oral. Pantogar aporta al cabello y las uñas los elementos reforzantes D-pantotenato cálcico, el aminoácido L-cistina así como la sustancia protéica queratina, la cual es el constituyente más importante del cabello.

Pantogar ejerce un efecto beneficioso en diversas formas de alopecia difusa. Se observa una mejoría en el crecimiento del pelo, tanto a partir del número de pelos caídos espontáneamente como mediante el examen de las raíces capilares. Pantogar mejora la estructura capilar, aumenta la resistencia del cabello a los daños mecánicos y químicos así como los causados por la luz solar y fortalece el cabello. Las alteraciones del crecimiento de las uñas mejoran considerablemente bajo el tratamiento con Pantogar. Las uñas se vuelven menos quebradizas y aumentan su elasticidad.

Indicaciones

Alopecia difusa (alopecia de etiología desconocida). Cambios degenerativos de la estructura capilar (cabello fatigado, fino, poco elástico, quebradizo, apagado, sin brillo y sin color), cabello dañado por la luz solar y la radiación UV, prevención del encanecimiento. Alteraciones del crecimiento de las uñas (uñas quebradizas, agrietadas y poco elásticas).

Método de empleo

Ingerir durante las comidas principales con un poco de líquido, sin masticar.

Posología

Salvo otro criterio médico, la posología debe cumplirse exactamente: adultos, 1 cápsula 3 veces al día, niños 1-2 x 1 cápsula al día según la edad. Duración media del tratamiento 3-6 meses. Si es necesario, se puede continuar o repetir el tratamiento.

Contraindicaciones

No se conocen contraindicaciones. Se recomienda la ingestión solo a partir de la segunda mitad del embarazo. Es inofensivo durante el período de lactancia.

Efectos adversos, interacciones, dependencias.

En casos aislados se reportaron reacciones de intolerancia como oleadas de calor, pulso acelerado, reacciones de la piel con prurito y urticaria.

Advertencias especiales para asegurar un empleo seguro

Puesto que la formación del pelo es un proceso lento, es importante tomar Pantogar en la dosis prescrita a lo largo de un período de 3-6 meses para asegurar el éxito del tratamiento.

Pantogar no está indicado para la alopecia cicatrizal o androgénica o convencional (alopecia masculina). En estos casos, sin embargo, Pantogar puede fortalecer el pelo que queda.

En caso de persistencia de los síntomas o si no se consigue el éxito esperado con el uso del fármaco, consulte a su médico.

No utilizar pasada la fecha de caducidad.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Tamaño del envase

90 cápsulas

Información para el almacenamiento

No guardar a temperaturas superiores a 25°C. Guardar protegido de la luz.

En caso de dudas, recabe el asesoramiento de un profesional.

pantogar®

Capsules

Manufacturer: Merz + Co., D-60318 Frankfurt
Owner of registration: Merz + Co., D-60318 Frankfurt

Composition

1 capsule contains: calcium D-pantothenate 60 mg, L-cystine 20 mg, thiamine mononitrate 60 mg, medicinal yeast 100 mg, keratin 20 mg, p-aminobenzoic acid 20 mg.
Excipients: q. s.

Properties and efficacy

Pantogar is an oral therapeutic agent for hair and nails. Pantogar supplies hair and nails with the fortifying substances calcium D-pantothenate and L-cystine, an amino acid. It also contains the protein Keratin which is the most essential constituent of the hair.

Pantogar has an advantageous effect in the case of various forms of diffuse hair loss. An improvement in hair growth is observed, both from the number of spontaneously lost hairs and by an examination of the hair roots. Pantogar improves the hair structure, increases the resistance of the hair to mechanical and chemical damage and damage caused by sunlight and strengthens the hairs. Nail growth disorders are greatly improved by treatment with Pantogar. The nails become less brittle and their elasticity increases.

Indications

Diffuse hair loss (hair loss for unknown reasons). Degenerative changes in the hair structure (stressed, thin, inelastic, brittle, lifeless, dull and colourless hair), hair damaged by sunlight and UV radiation, prevention of greying of the hair. Nail growth disorders (brittle, cracked and inelastic nails).

Method of use

Take at meal times with a little liquid, without chewing.

Dosage

Unless prescribed otherwise follow the dosage exactly: adults 1 capsule 3 times daily. Children 1-2 x 1 capsule daily according to age. Average duration of treatment 3-6 months. If necessary, the treatment can be continued or repeated.

Contra-indications

None known.

During pregnancy it is recommended that Pantogar be used only from the second half on. No side effects are known regarding ingestion during lactation.

Adverse effects, interactions, dependences

In rare cases, intolerance reactions, such as outbreaks of sweating, accelerated pulse, skin reaction with itching and hives, have been reported.

Special warnings to ensure safe use

Since hair formation takes place slowly, it is important to take Pantogar regularly in the prescribed dose over a period of 3-6 months in order to ensure success in the treatment.

Pantogar is not indicated either for hair loss with scarring or for androgenetic or conventional alopecia (male baldness). In these cases, however, Pantogar can strengthen the remaining hair.

If the symptoms persist or if the expected success is not achieved through the use of the drug, you should consult your doctor.

Do not use after the expiry date.

Keep out of the reach of children.

Pack sizes

90 capsules.

Storage information

Do not store at above 25°C. Store away from light.

In the event of queries, obtain professional advice.