

Information für Patientinnen
und Patienten

pantogar®

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen. Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, des Apothekers oder des Drogisten bzw. der Ärztin, der Apothekerin oder der Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Was ist Pantogar und wann wird es angewendet?

Pantogar ist ein Haar- und Nageltherapeutikum bei diffusen Haarausfall und brüchigen Nägeln. Pantogar wirkt über die Blutbahn auf den Zellstoffwechsel ein. So ist es möglich, den Haaren und Nägeln die Aufbaustoffe, die zur Gesunderhaltung und Stärkung notwendig sind, zuzuführen.

Pantogar enthält Vitamine der B-Gruppe, Aminosäuren, Mineralien und Spurenelemente. Vitamine der B-Gruppe, wie Pantothensäure und Thiamin sowie p-Aminobenzoesäure sind für Kopfhaut und Haar unentbehrlich. Der Pantothensäure kommt dabei eine besonders wichtige Funktion zu. Ein Mangel kann zu verstärktem Haarausfall und frühzeitigem Ergrauen führen. Medizinische Hilfe weist einen hohen Gehalt an Vitaminen, essentiellen Aminosäuren, Mineralien, Spurenelementen und Enzymen auf. Sie ist eine natürliche Quelle der Vitamine der B-Gruppe. Cystin, eine Aminosäure, die massgeblich für den Aufbau des Keratins verantwortlich ist, fördert das Wachstum gesunder Haare und Nägel. Keratin, ein schwefelreiches Protein, bildet den Hauptbestandteil der Haare und Nägel.

Pantogar zeigte in verschiedenen Prüfungen nachweisbare Verbesserungen der Haarqualität. Die Reissfestigkeit und die Oberflächenstruktur werden durch Pantogar positiv beeinflusst und die natürliche Haarfarbe verstärkt.

Pantogar macht das Haar widerstandsfähiger gegen mechanische Einwirkungen (intensives Kämmen, Bürsten, Toupieren), gegen chemische Schädigungen (Blondieren, Färben, Dauerwellen) sowie gegen übermässige Hitze einwirkung durch Fön, Frisierstäbe, Röntgen- oder UV-Strahlung, intensive Sonnen- oder Solariumeinwirkung.

Pantogar wird bei verschiedenen Haar- und Nagelwuchsstörungen allein oder zusammen mit äusserlich anzuwendenden Massnahmen (Einreibungen, Massagen usw.) und gegebenenfalls Behandlungen des Grundleidens angewendet:

Haarausfall als Folge von Krankheiten, Stoffwechsellstörungen, Vitaminmangel, Vergiftungen, Strahlenschäden, Erschöpfungszuständen, Stress-Situationen, Haarausfall als Folge der medikamentösen Behandlung z.B. mit gerinnungshemmenden, zellwachstumshemmenden, blutfettsenkenden Mitteln, Haarausfall nicht geklärt Ursache, Haarausfall während der 2. Hälfte der Schwangerschaft, im Wochenbett, während der Stillzeit, Haarausfall als Folge der medikamentösen Behandlung mit empfängnisverhütenden Mitteln nach Verordnung des Arztes oder der Ärztin. Haarstrukturschäden (strapaziertes, dünnes, unelastisches, sprödes, brüchiges, glanz- und farbloses Haar). Vorbeugende Behandlung gegen vorzeitiges Ergrauen.

Nicht infektiös bedingte Nagelerkrankungen und Nagelwuchsstörungen.

Pantogar zeigt bei Patienten mit brüchigen und splitternden Nägeln eine Abnahme der Brüchigkeit und eine Zunahme der Elastizität der Nägel.

Was sollte dazu beachtet werden?

Pantogar ist bei narbigem und kreisförmigem Haarausfall sowie bei der androgenetischen (hormonell bedingten) oder gewöhnlichen Alopezie (männliche Glatze) nicht angezeigt. Pantogar kann in diesen Fällen einzig eine Stärkung der noch verbleibenden Haare bewirken. Pantogar beeinflusst weder die Gesichtshaare noch die Arm- und Beinbehaarung, da diese anderen Wachstumsmechanismen gehorchen.

Der natürliche Haarwechsel verursacht einen Haarausfall von ungefähr 50–80 Haaren täglich. Erst wenn tagtäglich mehr Haare verloren gehen, besteht ein krankhafter Haarausfall.

Nehmen Haar- oder Nagelkrankheiten einen ungünstigen, stark fortschreitenden Verlauf, sollte ein Arzt bzw. eine

Ärztin aufgesucht werden, da diese Erkrankungen Anzeichen spezieller Allgemeinerkrankungen sein können.

Wann darf Pantogar nicht angewendet werden?

Bei bekannter Überempfindlichkeit auf einen Bestandteil des Präparates darf Pantogar nicht angewendet werden.

Wann ist bei der Einnahme von Pantogar Vorsicht geboten?

Wenn Sie gleichzeitig mit einem sulfonamidhaltigen Arzneimittel behandelt werden, sollten Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten, bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin fragen, ob und wie Sie Pantogar einnehmen dürfen.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten, bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie an anderen Krankheiten leiden, Allergien haben oder andere Arzneimittel (auch selbstgekauft) einnehmen oder äusserlich anwenden!

Darf Pantogar während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen werden?

Auf Grund der bisherigen Erfahrung ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder den Arzt, den Apotheker oder Drogisten bzw. die Ärztin, die Apothekerin oder Drogistin um Rat fragen.

Wie verwenden Sie Pantogar?

Die langsame Haar- und Nagelbildung und die Natur der Haar- und Nagelwuchsstörungen erfordern eine regelmässige, längerdauernde und möglichst frühzeitige Anwendung von Pantogar.

Soweit nicht anders verordnet, Erwachsene 3 x 1 Kapsel täglich, Kinder ab 12 Jahre 1–2 x 1 Kapsel täglich zu den Hauptmahlzeiten unzerkaut mit etwas Flüssigkeit einnehmen.

Die mittlere Behandlungsdauer liegt bei 3–6 Monaten. Erste Therapieerfolge sind in der Regel nach 3–4 Monaten sichtbar. Die Behandlung kann im Bedarfsfall fortgesetzt oder wiederholt werden.

Pantogar ist für Diabetiker geeignet.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann Pantogar haben?

Folgende Nebenwirkungen können bei der Einnahme von Pantogar auftreten:

Gastro-Intestinale Beschwerden wie Sodbrennen, Übelkeit, Blähungen und Bauchschmerzen sind möglich. In Einzelfällen sind Unverträglichkeitsreaktionen wie Schweissausbrüche, beschleunigter Puls, Hautreaktionen mit Juckreiz und Nesselfieber bekannt geworden.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die hier nicht beschrieben sind, sollten Sie Ihren Arzt, Apotheker, oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin informieren.

Was ist ferner zu beachten?

Bewahren Sie Pantogar sorgfältig, trocken bei Raumtemperatur (15–25°C) und ausserhalb der Reichweite von Kindern auf.

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP.» bezeichneten Datum verwendet werden. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist, bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist in Pantogar enthalten?

1 Kapsel enthält:

Wirkstoffe:

Thiaminnitrat 60 mg, Calciumpantothanat 60 mg, Methylthiothymol 100 mg, Cystin 20 mg, Keratin 20 mg, p-Aminobenzoesäure 20 mg

Hilfsstoffe:

Farbstoff E 132 und andere Hilfsstoffe.

38700 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie Pantogar?

Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien ohne ärztliche Verschreibung.

Originalpackungen zu 30, 90 und 300 Kapseln.

Zulassungsinhaber

Merz Pharma (Schweiz) AG

4123 Allschwil

Diese Packungsbeilage wurde im Mai 2004 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

Information
destinée aux patients

pantogar®

Lisez attentivement la notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant le médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par le pharmacien ou le droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications du médecin, du pharmacien ou du droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Qu'est-ce que Pantogar et quand est-il utilisé?

Pantogar est un médicament pour cheveux et ongles indiqué lors de chute diffuse des cheveux et d'ongles cassants. Pantogar agit par la voie des vaisseaux sanguins sur le métabolisme cellulaire. De cette manière est assuré l'approvisionnement suffisant des cheveux et des ongles en substances constitutives susceptibles de les maintenir en bonne santé et de les fortifier.

Pantogar contient des vitamines du groupe B, des acides aminés, des sels minéraux et des oligo-éléments. Les vitamines du groupe B telles que l'acide pantothénique et la thiamine ainsi que l'acide para-aminobenzoïque sont indispensables au cuir chevelu et aux cheveux. A ce titre, un rôle-clé revient à l'acide pantothénique dont le manque risque d'entraîner l'augmentation de la chute des cheveux et le grisonnement prématuré. La levure médicamenteuse est caractérisée par une teneur élevée en vitamines, acides aminés essentiels, sels minéraux, oligo-éléments et enzymes. Elle est une source naturelle en vitamines du groupe B. La cystine, un acide aminé participant essentiellement à la formation de la kératine, favorise la croissance de cheveux et d'ongles sains. La kératine, une protéine riche en soufre, constitue l'élément principal des cheveux et des ongles.

Différents tests ont montré que Pantogar améliore la qualité des cheveux de manière nette. Pantogar exerce une influence positive sur la résistance à la rupture et sur la structure capillaire superficielle et renforce la couleur naturelle des cheveux.

Pantogar rend les cheveux plus résistants aux agressions d'ordre mécanique (peignage énergique, brossage, crêpage), aux nuisances chimiques (décoloration, coloration, permanentes), à l'action de la chaleur excessive produite par le sèche-cheveux ou les bigoudis chauffants, aux rayons X ou UV, ainsi qu'à l'exposition intensive au soleil ou au rayonnement du solarium.

Pantogar est utilisé lors de troubles divers de la croissance des cheveux et des ongles, seul ou en association à d'autres mesures de traitement externe (frictions, massages, etc.) et le cas échéant, à des traitements de la maladie sous-jacente:

chute de cheveux consécutive à des maladies, des troubles métaboliques, des carences en vitamines, des intoxications, des lésions par irradiation, des états d'épuisement, des situations de stress; chute de cheveux consécutive à des traitements médicamenteux, par ex. par des anticoagulants, des inhibiteurs de la croissance cellulaire ou des médicaments diminuant le taux de lipides sanguins; chute de cheveux d'origine non définie; chute de cheveux se produisant durant la seconde moitié de la grossesse, pendant les couches et la période d'allaitement; chute des cheveux consécutive à un traitement par des contraceptifs oraux sur prescription médicale; altérations de la structure capillaire (cheveux fatigués, fins, raides, fragiles, cassants, sans éclat ni couleur). Traitement préventif contre le blanchiment prématuré des cheveux.

Affections des ongles d'origine non infectieuse et troubles de la croissance des ongles.

Pantogar diminue la fragilité et augmente l'élasticité des ongles chez les patients présentant des ongles cassants ou fendus.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?

Pantogar n'est pas indiqué en présence de chute de cheveux circonscrite et d'origine cicatricielle ainsi qu'en présence d'alopécie androgénétique (d'origine hormonelle) ou normale (calvitie chez l'homme). Dans ces cas, l'effet de Pantogar se limite à la fortification des cheveux restants.

Pantogar n'influence pas la pilosité du visage ni celle des bras ou des jambes, car elles sont réglées par d'autres mécanismes de croissance.

La repousse naturelle des cheveux provoque une chute quotidienne d'environ 50–80 cheveux. Ce n'est que lors-

que le nombre de cheveux perdus par jour dépasse ce seuil critique qu'il y a lieu de parler de chute pathologique. Si les affections des cheveux et des ongles prennent une évolution progressive défavorable, il faut consulter un médecin, ces affections pouvant être des signes de maladies générales spécifiques.

Quand Pantogar ne doit-il pas être utilisé?

Pantogar ne doit pas être administré en cas d'hypersensibilité connue à l'un des composants de la préparation.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Pantogar?

Si vous suivez simultanément un traitement par sulfamides, veuillez demander à votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si vous pouvez continuer le traitement par Pantogar et si oui, comment le poursuivre. Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si vous souffrez d'une autre maladie, vous êtes allergique, vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication)!

Pantogar peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis du médecin, du pharmacien ou du droguiste.

Comment utiliser Pantogar?

La formation lente des cheveux et des ongles et la nature spécifique des troubles de croissance capillaire et unguéale exigent une prise régulière de Pantogar pendant une période prolongée et une instauration du traitement aussi précoce que possible. Sauf avis médical contraire, les adultes prennent 1 capsule 3x par jour; les enfants dès 12 ans prennent 1 capsule 1-2x par jour, sans les croquer et avec un peu de liquide au cours des repas principaux. La durée moyenne du traitement est de 3-6 mois. En règle générale, les premiers résultats se manifestent au bout de 3-4 mois. En cas de besoin, le traitement peut être prolongé ou répété.

Pantogar est adapté pour les diabétiques.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Pantogar peut-il provoquer?

La prise de Pantogar peut provoquer les effets secondaires suivants:

Troubles gastro-intestinaux comme par ex. aigreurs d'estomac, nausée, flatulences et douleurs abdominales sont possibles.

Dans des cas isolés, des réactions d'intolérance comme une de transpiration excessive, une accélération du pouls, des réactions cutanées avec prurit et urticaire ont été observées.

Si vous remarquez d'autres effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

A quoi faut-il encore faire attention?

Conserver Pantogar soigneusement au sec à température ambiante (15-25°C) et hors de la portée des enfants. Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention "EXP" sur le récipient. Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient Pantogar?

1 capsule contient :

Principes actifs:
60 mg de nitrate de thiamine, 60 mg de pantothénate de calcium, 100 mg de levure médicamenteuse, 20 mg de cystine, 20 mg de kératine, 20 mg d'acide p-aminobenzoïque.

Excipients:

Colorant E 132 et autres excipients.

38700 (Swissmédic)

Où obtenez-vous Pantogar ?

Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Emballages d'origine de 30, 90 et 300 capsules.

Titulaire de l'autorisation

Merz Pharma (Suisse) SA
4123 Allschwil

Cette notice d'emballage a été contrôlée par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic) en mai 2004.

Information
destinée ai pazienti

pantogar®

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Faccia uso corretto del medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico, del farmacista o del droghiere, al fine di ottenere il maggior beneficio. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Che cos'è Pantogar e quando lo si usa?

Pantogar è un medicamento per i capelli e per le unghie in caso di diffusa perdita dei capelli e unghie fragili. Pantogar agisce attraverso il sangue sul metabolismo cellulare. Soltanto così è possibile procurare ai capelli e alle unghie le sostanze costitutive necessarie per mantenerli sani e rinvigorirli.

Pantogar contiene vitamine del gruppo B, aminoacidi, minerali e microelementi. Le vitamine del gruppo B come acido di pantotenato e tiamina nonché acido para-aminobenzoico sono indispensabili per il cuoio capelluto e i capelli. In questo contesto bisogna attribuire una funzione particolarmente importante all'acido di pantotenato. Una mancanza può condurre ad una caduta di capelli intensificata ed alla canizie precoce. Il lievito medicinale possiede un altro contenuto di vitamine, aminoacidi essenziali, minerali, microelementi ed enzimi. E una fonte naturale per vitamine del gruppo B. La cistina, un aminoacido che è essenzialmente responsabile della formazione della cheratina, stimola la crescita di capelli e unghie sani. La cheratina, una proteina ricca di zolfo, costituisce la parte principale dei capelli e delle unghie.

In vari esami Pantogar ha dimostrato dei miglioramenti provati della qualità del capello. Pantogar influenza positivamente la resistenza alla rottura e la struttura della superficie. Il colore naturale del capello viene intensificato.

Pantogar rende il capello più resistente agli influssi meccanici (pettinare intensamente, spazzolare, cotonare), ai danneggiamenti chimici (ossigenazione, tintura, permanente) e all'effetto di calore eccessivo causato dall'asciugacapelli, da ferri d'ondulazione, da irradiazione roentgen o UV, dall'effetto intenso del sole o di impianti per l'abbronzatura.

Pantogar viene utilizzato in caso di vari disturbi della crescita dei capelli o delle unghie, da solo o con misure esterne (strofinamenti, massaggi, ecc.) e, se del caso, con trattamenti della patologia di base: caduta dei capelli in seguito a malattie, a disturbi del metabolismo, a carenze vitaminiche, ad intossicazioni, a danni dovuti a raggi, a stati di esaurimento, situazioni di stress, caduta dei capelli conseguenti a trattamenti medicamentosi quali anticoagulanti, citostatici, anticolesteroli, caduta dei capelli per cause non diagnosticate, caduta dei capelli durante la seconda metà della gravidanza, il puerperio, durante l'allattamento, quale conseguenza di trattamenti medicamentosi con anticoncezionali secondo prescrizione del medico. Danni alla struttura dei capelli (capelli strappazzati, fini, non elastici, fragili e che si rompono facilmente, capelli senza lucentezza e colore). Trattamento preventivo per il prematuro diventare grigio dei capelli, per malattie delle unghie e della crescita delle stesse non dovute ad infezioni.

Pantogar dimostra nei pazienti con unghie fragili e scheggianti una diminuzione della fragilità ed un'aumentata elasticità delle unghie.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Pantogar non è indicato né in caso di perdita dei capelli di origine cicatriziale e di alopecia areata, né in caso di alopecia androgenetica (di origine ormonale) o normale (calvizie dell'uomo). In tali casi l'effetto di Pantogar si limita al rinvigorimento dei rimanenti capelli.

Pantogar non interferisce né nella crescita dei peli della faccia, né in quella delle braccia e delle gambe, dato che questa è regolata da meccanismi diversi.

La mutazione naturale dei capelli provoca una perdita di circa 50-80 capelli al giorno. Soltanto se ogni giorno vengono persi di più capelli si può parlare di una caduta di capelli patologica.

Se le malattie dei capelli o delle unghie hanno un decorso infausto e continuo, occorre farsi visitare da un medico poiché queste patologie possono essere un segnale di particolari malattie generiche.

Quando non si può usare Pantogar?

In caso di ipersensibilità ad uno dei componenti del preparato, Pantogar non deve essere usato.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Pantogar?

Se nello stesso tempo si trova in cura medica sotto trattamento con un medicamento sulfonamidico dovrebbe chiedere al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere se e come può prendere Pantogar.

Informi il suo medico, il suo farmacista o droghiere nel caso in cui soffra di altre malattie, soffra di allergie o assuma o applichi altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa).

Si può somministrare Pantogar durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino, se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia non sono mai stati effettuati studi scientifici sistematici. Per precauzione dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e l'allattamento o chiedere consiglio al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Come usare Pantogar?

La formazione lenta del capello e dell'unghia e la natura dei disturbi nella crescita di capelli e unghie richiedono un uso regolare di Pantogar iniziato il più presto possibile che duri parecchio tempo.

Salvo altra prescrizione medica, gli adulti prendono 1 capsula 3 volte al giorno, i bambini a partire da 12 anni prendono 1 capsula 1-2 volte al giorno, senza masticare con un po' di liquido durante i pasti principali.

La durata media del trattamento è di 3-6 mesi. Di regola i primi successi terapeutici sono visibili dopo 3-4 mesi. Se necessario si può continuare o ripetere la cura.

Pantogar è adatto per i diabetici.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Pantogar?

In seguito all'assunzione di Pantogar possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Disturbi gastrointestinali come per es. bruciore di stomaco, nausea, flatulenza e dolori addominali sono possibili.

In casi isolati sono stati osservati reazioni di intolleranza come per es. sudorazione eccessiva, polso accelerato, reazioni cutanee con prurito e orticaria.

Se osserva effetti collaterali qui non descritti, dovrebbe informare il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Conservare Pantogar con cura, in un luogo secco e a temperatura ambiente (15-25°C), fuori della portata dei bambini.

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con „EXP“ sulla confezione.

Il medico, il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Che cosa contiene Pantogar?

1 capsula contiene:

Principi attivi:

60 mg di nitrate di tiamina, 60 mg di pantotenato di calcio, 100 mg di lievito medicinale, 20 mg di cistina, 20 mg di cheratina, 20 mg di acido para-aminobenzoico.

Sostanze ausiliarie:

Colorante E 132 ed altre sostanze ausiliarie.

38700 (Swissmedic)

Dov'è ottenibile Pantogar?

Quale confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria senza prescrizione medica. Imballaggio originale da 30, 90 e 300 capsule.

Titolare dell'omologazione

Merz Pharma (Svizzera) SA
4123 Allschwil

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel maggio 2004 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

MN 35566 MC 1480